INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

# VACUNACIÓN FRENTE AL NEUMOCOCO

## Recomendaciones en pacientes que han padecido COVID-19

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA Y VACUNAS

Organización Colegial de Enfermería de España

### 1 Justificación

Se ha demostrado que el COVID-19 puede ocasionar problemas pulmonares persistentes en el tiempo.

Con el objetivo de prevenir complicaciones relacionadas con la infección del neumococo, se recomienda la vacunación a las personas que han padecido COVID-19 grave.

### 2 Tipos de vacunas

| Vacuna Neumococo **Conjugada 13 valente (VNC13)** | Vacuna Neumococo **Polisacárida 23 valente (VNP23)** |
|---|---|
| Vacuna con 13 serotipos que genera respuesta y memoria inmunitaria | Vacuna con 23 serotipos que sólo genera respuesta inmunitaria de corta duración |
| | Se administra complementando la pauta de VNC13 en ciertos grupos de riesgo |
| Indicada por ficha técnica a partir de las 6 semanas de edad | Indicada por ficha técnica a partir de los 2 años de edad |

### 3 Pautas recomendadas

**POBLACIÓN QUE HA PADECIDO COVID-19 GRAVE**

| **Sin** dosis previa de **VNC13** | **Con** dosis previa **VNC13** |
|---|---|
| **1 dosis VNC13** | No administrar otra dosis |

**POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO**

**PAUTA SECUENCIAL**

**A** **No vacunado previamente:**

Recomendado 12 meses: **VNC13** → **VNP23**

Recuerdo (si indicado) 5 años: **VNP23**

*Mínimo 8 semanas*

**B** **Vacunado previamente VNP23:**

Dosis previa **VNP23** — 12 meses → **VNC13** — Recomendado 12 meses → **VNP23**

*Mínimo 8 semanas*

Recuerdo (si indicado) 5 años

**C** **Vacunado previamente VNC13:**

Dosis previa **VNC13** — Recomendado 12 meses / *Mínimo 8 semanas* → **VNP23**

Recuerdo (si indicado) 5 años: **VNP23**

**NIÑOS**

Seguir las recomendaciones del Calendario de Vacunación y de la ficha técnica de **VNC13** (2, 4 y 11 meses)

### 4 Precauciones especiales de conservación

- **VNC13**, **VNP23**: Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C)
- No congelar

### 5 Vías de administración y dosis

| | |
|---|---|
| **VNC13** | Dosis: 0,5 ml<br>Vía: Intramuscular |
| **VNP23** | Dosis: 0,5 ml<br>Vía: preferentemente intramuscular o subcutánea |

### 6 Contraindicaciones de la vacunación

| | |
|---|---|
| **VNC13** | Reacción alérgica grave tras dosis previa de VCN13, a un componente de la vacuna, o a cualquier vacuna que contenga toxoide diftérico. |
| **VNP23** | Reacción alérgica grave tras dosis previa de vacuna o a un componente de la vacuna |

Siempre hay que posponer temporalmente la vacunación si se presenta enfermedad aguda moderada o grave con o sin fiebre (hasta que la enfermedad se resuelva)

Si ha padecido COVID-19 grave hay que **esperar** por precaución un intervalo de **15-30 días** desde la finalización de los síntomas

Recomendaciones a fecha 23 -5-2022